

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО
НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА ПО РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ
(УПРАВЛЕНИЕ РОСПОТРЕБНАДЗОРА
ПО РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ)

ул. Машиностроителей, д. 121, г. Йошкар-Ола, 424007
Тел.(8362) 68-19-97, факс: (8362) 68-19-30
E-mail: sanepid@12.rosпотребnadzor.ru
<http://12.rosпотребnadzor.ru>
ОКПО 76860627 ОГРН 1051200013820
ИНН/КПП 1215101152/121501001

Руководителям
министерств и ведомств

04.12.2019 № 12-00-04/76-1880-2019

на №_____ от _____

О мерах профилактики ГЛПС

Ежегодно в осенне-зимний период наблюдается подъем заболеваемости населения ГЛПС, который связан с массовой миграцией грызунов в населенные пункты и их расселением по жилым домам, общественным зданиям и сооружениям, что способствует заражению граждан в бытовых условиях и на производстве.


В целях стабилизации заболеваемости ГЛПС, предупреждения групповых случаев и летальных исходов среди жителей Республики Марий Эл, в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.7.2614-10 «Профилактика геморрагической лихорадки с почечным синдромом» и на основании п.8 ст.51 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» вношу предложение:

о размещении памятки по профилактике ГЛПС на своих официальных сайтах.

О проведенной работе прошу проинформировать Управление Роспотребнадзора по Республике Марий Эл в срок 12.12.2019г. по факсу 68-19-30 или по электронной почте epid@12.rosпотребnsdzor.ru.

Приложение: памятка на 1л., в 1экз.

Руководитель



С.И. Булатова

Зубарева Лариса Эрнестовна
(8362) 68-19-56



Профилактика ГЛПС

Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС)- тяжелое, смертельно опасное инфекционное заболевание, с поражением мелких кровеносных сосудов, почек, легких и других органов человека.

Заболевание широко распространено в Республике Марий Эл благодаря высокой численности носителей вируса ГЛПС в природе – лесных грызунов, в особенности рыжей полевки. Вирус ГЛПС попадает во внешнюю среду с выделениями зараженных зверьков.

Пути передачи инфекции:

- **Воздушно-пылевой** (до 85 %), при котором пыль, содержащая высохшие выделения грызунов, а, следовательно, и вирус, попадает при дыхании в организм человека;
- **Контактно- бытовой** – курение и прием пищи грязными руками или непосредственной контакт со зверьками;
- **Алиментарный** – употребление без термической обработки в пищу продуктов питания, которые загрязнены выделениями грызунов, имею следы погрызов.

Заболевание от человека к человеку не передается!

Когда происходит заражение человека ГЛПС:

- При посещении леса, отдыхе на природе;
- При постоянной работе в лесу;
- Во время сельскохозяйственных работ;
- При работе, уборке на дачных участках (обычно весной и осенью);

Как проявляется ГЛПС?

С момента заражения до появления первых признаков заболевания проходит 7-10 дней. Начало заболевания похоже на обычную острую респираторную инфекцию - повышается температура, появляется головная боль, боли в мышцах, общая слабость, потеря аппетита, иногда тошнота и рвота. На 4-5 день к перечисленным симптомам присоединяются боли в пояснице и животе, иногда на коже появляется сыпь. Нарушается функция почек, беспокоит жажда, сухость во рту, икота. Возникают кровотечения – почечные, желудочные, носовые и др.

ПОМНИТЕ: вакцины или специфического иммуноглобулина против ГЛПС не существует.

При любых проявлениях заболевания необходимо как можно быстрее обратиться в поликлинику по месту жительства. Лечение проводится только в стационаре, самолечение опасно!

В целях профилактики ГЛПС:

- Во время работы при большом количестве пыли необходимо использовать рукавицы и респиратор или ватно-марлевую повязку, уборка помещений должна проводиться только влажным способом;
- Продукты должны быть недоступными для грызунов, храниться в герметичной таре, поврежденные грызунами пищевые продукты нельзя использовать в пищу;
- Строго запрещается курить и принимать пищу немытыми руками;
- Обработку от грызунов (дератизацию) рекомендуется проводить не реже 2 раз в год, особенно в периоды массовой миграции грызунов в жилые и производственные помещения: в апреле-мае и в сентябре-октябре.