

ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПРИ ВНУТРЕННЕМ КРОВОТЕЧЕНИИ

⚠ **ВАЖНО:**

Внутренние кровотечения чрезвычайно опасны! Без специального медицинского

4.3 ВНУТРЕННЕЕ КРОВОТЕЧЕНИЕ

⚠ **ВАЖНО:**

Внутренние кровотечения чрезвычайно опасны! Без специального медицинского оборудования установить наличие внутреннего кровотечения можно по внешнему виду человека. Внимательно осмотрите пострадавшего!

▮ **ПРИЗНАКИ ВНУТРЕННЕГО КРОВОТЕЧЕНИЯ:**

- Бледность кожных покровов и слизистых оболочек
- Общая слабость
- Головокружение
- Сонливость
- Кашель с выделением крови (при легочном кровотечении)
- Тошнота и кровавая рвота (при кровотечении из верхних отделов желудочно-кишечного тракта)
- Тёмный или дегтеобразный стул
- Боли в животе
- Холодный липкий пот
- Мелькание «мушек» перед глазами

▮ **ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ВНУТРЕННЕМ КРОВОТЕЧЕНИИ**

Что понадобится:



Лёд, снег, бутылка с холодной водой, аккумуляторы холода из сумки-холодильника или любой другой источник холода

⚠ **ВАЖНО:**

Если у пострадавшего идет кровь изо рта, он не может подняться, задыхается, то ему нужно придать полусидячее положение. Нельзя давать ему лечь, иначе он захлебнется!



1 Обездвижьте пострадавшего и обеспечьте ему покой.

2 Приложите холодный компресс

к предполагаемому месту кровотечения.



Лёд, снег, бутылка с холодной водой, аккумуляторы холода из сумки-холодильника или любой другой источник холода

В качестве компресса может служить любой из вышеперечисленных источников холода. При подозрении на внутреннее кровотечение пострадавшего необходимо **как можно скорее** доставить **в лечебное учреждение**.

виду человека. Внимательно осмотрите пострадавшего!

ПРИЗНАКИ ВНУТРЕННЕГО КРОВОТЕЧЕНИЯ:

- Бледность кожных покровов и слизистых оболочек
- Общая слабость
- Головокружение
- Сонливость
- Кашель с выделением крови (при легочном кровотечении)
- Тошнота и кровавая рвота (при кровотечении из верхних отделов желудочно-кишечного тракта)
- Тёмный или дегтеобразный стул
- Боли в животе
- Холодный липкий пот
- Мелькание «мушек» перед глазами

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ВНУТРЕННЕМ КРОВОТЕЧЕНИИ

Что понадобится:



Лёд, снег, бутылка с холодной водой, аккумуляторы холода из сумки-холодильника или любой другой источник холода

ВАЖНО:

Если у пострадавшего идет кровь изо рта, он не может подняться, задыхается, то ему нужно придать полусидячее положение. Нельзя давать ему лечь, иначе он захлебнется!



1 Обездвижьте пострадавшего и обеспечьте ему покой.

2 Приложите холодный компресс

к предполагаемому месту кровотечения.



Лёд, снег, бутылка с холодной водой, аккумуляторы холода из сумки-холодильника или любой другой источник холода

В качестве компресса может служить любой из вышеперечисленных источников холода. При подозрении на внутреннее кровотечение пострадавшего необходимо **как можно скорее** доставить **в лечебное учреждение**.