



# Семинар-тренинг «Интеграция детей, затронутых эпидемией ВИЧ-инфекции, в образовательную среду»

Название организации,  
проводящей семинар-  
тренинг



# Профилактика заражения ВИЧ «Аварийные» ситуации

Презентация 8



# **Профилактика ВИЧ-инфицирования**

**Соблюдение всех мер защиты при оказании первой помощи и своевременно проведенные профилактические мероприятия при возникновении «аварийных» ситуаций снижают вероятность инфицирования персонала до нуля**

# **Данные ВОЗ о фактах инфицирования медработников за время эпидемии ВИЧ во всем мире**

**Риск передачи ВИЧ при повреждении кожи (прокол иглой)  
составляет 0,32%**

**При попадании инфицированного биологического материала  
на слизистые – 0,03%**

**Неповрежденная кожа – непреодолимый барьер для ВИЧ**

# **Санитарно-гигиенический режим в детских коллективах**

**Одноразовый медицинский инструментарий**

**Аптечка первой помощи, укомплектованная перчатками**

**Набор медикаментов должен включать 3%-й раствор перекиси водорода, антисептики**

**Медицинская помощь оказывается в латексных или резиновых перчатках**

# Санитарно-гигиенический режим в детских коллективах

## При контакте с кровью:

- при загрязнении рук кровью – обработать тампоном, смоченным 3%-м раствором перекиси водорода или 70%-м раствором спирта в течение 30 секунд; дважды вымыть под проточной водой с мылом, насухо вытереть чистой салфеткой;
- при повреждении кожных покровов острыми предметами – выдавить кровь из ранки, промыть место ранения под проточной водой с мылом, обработать место ранения антисептиком (перекись водорода, йод и т.п.);
- при попадании крови на слизистые глаз – промыть глаза 1%-м раствором борной кислоты или большим количеством воды;
- при попадании крови на слизистую рта – прополоскать рот 1%-м раствором борной кислоты или большим количеством воды

# **Санитарно-гигиенический режим в детских коллективах**


**Если произошел прокол кожи иглой от шприца, порез нестерильным инструментом или если чужая кровь попала на слизистые оболочки, необходимо проконсультироваться с районным инфекционистом или обратиться в центр по профилактике и борьбе со СПИДом в течение **72 часов** с момента возникновения «аварийной» ситуации (**лучше – в первые 24 часа**) для решения вопроса о назначении медикаментозной профилактики**

**Через 72 часа после возникновения «аварийной» ситуации профилактические мероприятия считаются неэффективными!!!**

**Лучшее решение проблемы оказания медицинской помощи  
при травмах – снижение травматизма у детей**

**Дети, которые усвоили правила общения и совместных игр,  
которые заняты делом, которые чувствуют внимание  
взрослых, не разрешают конфликты с помощью драки**

Спасибо за внимание !



объединимся ради детей!